vertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F. C.C.P. Montpellier 5238-12 G

GRANDES CULTURES

N° 8 - 19 décembre 1988

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

DESHERBAGE DES CULTURES INSTALLEES :

- C'EST LA PERIODE
- A FAIRE SOIGNEUSEMENT, EN BROYANT D'ABORD LA VEGETATION
- * Les conséquences des mauvaises herbes peuvent être très graves :
 - 1) pertes de rendements
 - jusqu'à 2-3 qx/ha (concurrence pour l'eau et les sels minéraux)
 - 2) refus des lots par :
 - impossibilité de triage
- pourcentage excessif de graines indésirables (Ray-Grass, Renouées, Ombellifères, Rumex) qui augmentent le pourcentage de déchets).
- * Désherber c'est choisir une spécialité en fonction :
- l) des travaux culturaux et des dates de semis c'est à dire du <u>DIAMETRE DES RACINES</u>
 - supérieur à 8-10 cm (diamètre d'un crayon) = culture bien développée bien installée
 - inférieur à 8-10 cm = culture peu développée
 - 2) des adventices à détruire
 - avec une flore diversifiée : GRAMINEES DICOTYLEDONES
 - qui sont peu ou très abondantes

MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal 34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



P38

REPOS VEGETATIF	VEGETATION ACTIVE	SPECIALITES	GRAMI DICOTYLEDONES Piss	DOSE/HA de p.
DEC JAN FEV	POUSSES APRES DE 5 cm PRECOUP.	COMMERCIALES	iss. plant aiteron lminthe ronique ricaire mon ois. chiendent armelles	en kg ou l.

1 - CULTURES BIEN INSTALLEES DIAMETRE DES RACINES SUPERIEUR A 8-10 mm

	No.	seul traitement mb. SPEC. ** (à base de diuron) GRAMOXONE 2000; u TOTACOL	•	0 0			0 0	0 0	0 0	Δ Δ	2	+ 2
	d	traitements successifs ** iuron (déc.) uis VELPARS	•	Δ	•	•		•	•	Δ	2	puis I
•	S	INBAR	•	Δ	•	•	•	Δ	Δ	Δ	0	,8 à 1
	L	EGURAME P.M.	•	0	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	3	, 5
	V	EGEPRON DS ques de jaunissement)	•	Δ	•	•	•	Δ	Δ	Δ	(à 8
1 500 6306 555 10		ELPAR S **	0	Δ		•	•		•	0	on s	1
	• F	ERVIN + HUILE 11.	•	•	Δ	۵	Δ	Δ	Δ	Δ	1	(à 3*)
		USILADE + AGRAL 0,5 1.	•	•	ΔΔ	4 4	4	4 4	ΔΔ	Δ	1	,5 (à 3+)

2 - CULTURES PEU DEVELOPPEES (semis sous-couvert printemps 87 ou automne 87) DIAMETRE DES RACINES INFERIEUR A 8 mm

	in the state of	KERB ULTRA + GRAMOXONE 2000	•	0	•	Δ	•	Δ	Δ	Δ	1,5 + 2
		KERB ULTRA (seul)	•	0	•	Δ	•	Δ	Δ	Δ	1,5
•		LEGURAME P.M.	•	0	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	3,5

3 - TRAITEMENTS SPECIFIQUES

RUMEX au début montaison : stade cigare)	ASULOX	The Street Alek - 1 advancions	4
CUSCUTE (sur tâches au démarrage)	DACTHAL W 75 + REGLONE 2		6 + 2

● Efficacité satisfaisante ● Efficacité moyenne △ Efficacité insuffisante

- * dose efficace contre chiendent rampant
 - ** pour cultures très sales